




Union Gaule Autunoise et Pêcheurs Morvandiaux

Fiche Technique de l'Espèce

Le Vairon



Description :	Famille des Cyprinidés. <i>Phoxinus phoxinus</i> . Dans les ruisseaux, rivières et lacs clairs et bien oxygénés.
Taille	8 à 10 cm
Poids moyen	20 g
Record connu	14 cm pour 25 g
Durée de vie	3 à 6 ans
Alimentation	Petits invertébrés, crustacés, gammares et larves d'insectes.
Reproduction	De mai à juillet sur un lit de sable ou de gravier. Ponte : 1 000 à 5 000 ovocytes

Le **vairon** (*Phoxinus phoxinus*) est une petite [espèce](#) de [poisson potamodrome](#) très commun dans les eaux douces et bien oxygénées. Il tolère un [pH](#) de 7 à 7,5.

Le vairon migre chaque année pour assurer sa reproduction, de la « zone à barbeaux » vers des eaux à substrat gravillonnaire, souvent « à [salmonidés](#) prédominants » ([première catégorie](#)), où il devient une proie de choix pour la [truite](#), et pour le [brochet](#).

Noms vernaculaires

Vairon est un adjectif et [substantif](#) dérivé de l'adjectif populaire **vair** ([XI^e siècle](#), du [latin](#) *varius*, « bigarré, tacheté », qui a donné les noms demi-savants « variole », « vérole », etc.) et dont l'usage est attesté en français depuis le [XII^e siècle](#) pour désigner un « poisson tacheté ». Le mot se rencontre comme adjectif uniquement dans l'expression « yeux vairons » (par exemple, un iris bleu et l'autre marron), qui est un cas remarquable d'[hétérochromie](#).

- **Mené** (ou méné) au [Québec](#), **Graevî** en Wallon, [Pesquit](#) en [Béarn](#), Gardèche dans le sud-ouest de la France.
- Noms vernaculaires étrangers : Elrits (néerlandais), Elritsa (suédois), Elritse (danois), Elritze (allemand), Fregarola (italien), Minnow (anglais), Muti (finlandais), Ørekyte (norvégien), Pijor (croate), Piscardo (espagnol), Střevle potoční (cs), Strzebla potokowa (polonais), Гольян (russe)...

Description

Petit poisson élancé-cylindrique, de 4 à 10 (14) cm de long ;

- Tête à museau arrondi, orifice buccal horizontal, supère, de taille réduite.
- Nageoires arrondies, la caudale nettement échancrée, la dorsale élevée.
- Dos gris verdâtre, rayé transversalement foncées, flancs argentés,
- Ventre blanc, puis rouge cuivré chez le mâle (en période de fraye).
- Écailles discrètes, petites et denses (70 à 90 par ligne). Ligne latérale interrompue.

Le Vairon fréquente les eaux claires à faibles courants. Il occupe des habitats peu profonds avec de nombreux herbiers ou branches et préfère les fonds composés de graviers. Il fréquente aussi les lacs d'altitude (jusqu'à 2 500m). Ce petit poisson est grégaire et se montre très actif. Des études démontrent que les bancs sont constitués pour les 3/4 de regroupements familiaux. A proximité d'un prédateur comme le brochet, les Vairons se regroupent en bancs serrés et dressent leurs nageoires. Ce signe d'alarme informe chacun d'un danger immédiat. Le Vairon est vorace. Il consomme aussi bien des végétaux (algues), que de petits animaux (larves, œufs de poissons). Dans les lacs, ce poisson apprécie de petits crustacés voir des larves de Crémones. La maturité sexuelle du Vairon intervient à l'âge de 2 ou 3 ans. En période de fraye, le mâle prend des couleurs vives (ventre rouge). Le ponte fractionnée intervient dans une eau à 10°C peu profonde. sur des fonds graveleux. L'incubation durera moins d'une semaine dans une eau à 13°C.

Biologie

- Longévité : de 3 à 6 ans. Maturité sexuelle à 2 ou 3 ans.
- Régime alimentaire : omnivore et vorace, se nourrit aussi bien d'[algues](#) et de débris végétaux que d'animalcules : vers, petits [mollusques](#), [alevins](#), [larves](#) d'[insectes](#), etc.
- Mode de vie : grégaire, en bancs compacts
- Reproduction : d'avril à juillet, remonte en bancs les ruisseaux de faible profondeur.
- Ponte fractionnée en eau peu profonde et graveleuse, les œufs adhérant aux graviers.
- Incubation moyenne : 4 à 7 jours selon la température et l'écologie.

Habitat et répartition géographique

Aime les eaux limpides, fraîches, bien oxygénées, peu profondes et graveleuses des petits ruisseaux comme des grandes rivières, torrents et les lacs d'altitude à fond de graviers jusqu'à l'étage préalpin. Affectionne les trous le long des berges et les herbiers aquatiques.

Présent dans presque toute l'[Eurasie](#), du nord de l'[Espagne](#) à la [Sibérie](#) occidentale. Absent en [Corse](#), [Italie](#) méridionale, [Grèce](#).

Source : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon_\(poisson\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon_(poisson))